




BULLETIN SUR L'ETAT DE LA NAPPE DE LA CRAU

Aout 2026 – situation à fin juillet 2026

En bref

En ce mois de juillet, l'état quantitatif de la nappe de la Crau demeure satisfaisant, avec des niveaux globalement supérieurs aux normales malgré une légère dégradation dans le secteur de Mas Thibert. L'irrigation gravitaire du foin de Crau soutient la dynamique à la hausse qui se poursuit dans l'Est du territoire et ralentit dans le sillon d'Arles. La situation en Durance nécessite néanmoins un suivi attentif.

**Illustration 1 - Indicateurs des états relatifs des niveaux de nappe par piézomètre
pour un mois de juillet sur la période 2013-2026**



La dynamique de la nappe (symboles) est analysée par rapport à la situation de juin 2026 (i.e. du mois précédent celui du présent bulletin) et le niveau d'eau de la nappe (couleurs) est analysé par rapport aux mois de juillet des années précédentes (comparaison des moyennes mensuelles).

Sources : SYMCRAU, BRGM


Sur le secteur des Coussouls, influencé par les pluies (Pz95/21b), les niveaux demeurent supérieurs à la normale. La dynamique à la baisse s'y poursuit normalement en cette saison sèche.

Dans le sillon d'Arles (Pz5), les niveaux sont supérieurs à la moyenne avec une dynamique générale stable. Seuls quatre points demeurent inférieurs à la normale, à l'Ouest, dans le secteur de Mas Thibert où les prairies sont irriguées par pompage.

Dans la partie Nord-Est de la nappe (Salon et Eyguières), la remontée saisonnière se poursuit et l'ensemble des points présentent des niveaux proches ou supérieurs à la normale, à l'exception d'un point (Pz22) où le niveau est bas pour la saison.

À l'Est, dans le sillon de Miramas (Pz6), la hausse des niveaux se poursuit plus nettement. Ceux-ci sont supérieurs à la moyenne, exception faite d'un point modérément bas (Pz8, représentatif du substratum Miocène). Sur le Pz6, le niveau de ce mois de juillet 2026 est 1,57 m plus haut que celui relevé à la même période en 2025.


Illustration 2 – Suivis mensuels des 3 piézomètres représentatifs du territoire (en niveaux moyens mensuels)



➔ La pluviométrie

Le cumul de précipitations du mois de juillet est légèrement supérieur à la normale à la station d'Istres (13.2 mm, +6 % en moyenne mensuelle). Les précipitations ont été hétérogènes sur l'ensemble du territoire.

Illustration 3 - Cumul mensuel des précipitations à Istres (en mm)



Le cumul des précipitations mesurées au mois de juillet 2026 est de 13.2 mm, ce qui représente un excédent de 6% par rapport à la normale d'un mois de juillet (12.5 mm pour la station Istres – Le Tubé entre 1981 et 2020).

Sources :
Météo France, Infoclimat

Cumul mensuel des précipitations mesurées sur la station d'Istres – Le Tubé sur la période janvier 2026– décembre 2026

➔ Actualités climatiques

Le mois de juillet a été marqué par des températures supérieures aux normales de saison (+4.3°C à la station d'Istres).

Les précipitations ont été majoritairement déficitaires sur l'ensemble du bassin versant de la Durance (-74 % par rapport à la normale à Embrun, -2 % à Sisteron, -54 % à Pertuis et +6 % à Istres).

➔ Actualités hydrauliques

Au 28 juillet, la cote du lac de Serre-Ponçon était de 777.25 m NGF, soit +2.25 mètres au-dessus de sa cote de compatibilité touristique.

L'alimentation de la nappe de la Crau dépend de la situation en Durance. Si le niveau actuel du lac de Serre-Ponçon est satisfaisant, selon les prévisions (Vigie Durance Verdon), un déficit de précipitations et de fortes températures en août pourraient entraîner un passage sous la cote de compatibilité touristique de 775 m NGF avant le 31 août.

➔ Règlementation en cours

La nappe de la Crau est rattachée comme chaque année depuis le 1^{er} mars à l'arrêté cadre interdépartemental du bassin Durance-Verdon. La nappe de la Crau, au même titre que l'ensemble du bassin versant de la Durance, est classée en vigilance sécheresse depuis le 3 juillet 2026.

➡ Pour en savoir plus

Le cycle de l'eau en Crau

La nappe de la Crau est alimentée en moyenne à 70% par l'eau d'irrigation transférée depuis le bassin versant de la Durance et à 30% par les pluies locales. Le régime hydrologique de cette nappe est donc inversé par rapport au cycle naturel : les hautes eaux y sont estivales et les basses eaux interviennent en fin d'hiver / début du printemps. La ressource, exploitée par pompage pour les différents usages, se vidange naturellement vers les marais, la Camargue et la mer.

Sur le site internet du SYMCRAU :

[Le territoire de La Crau](#)

[Le fonctionnement de la nappe](#)

[Le réseau de surveillance de la nappe](#)

[Tous les bulletins mensuels de situation hydrologique de la Crau](#)

Réalisation :

Syndicat mixte de gestion des
nappes de la Crau
Cité des entreprises, Lot N°20
25 Avenue du Tubé, 13800 Istres
Tél. 04 42 56 64 86
contact@symcrau.com
www.symcrau.com



Partenaires techniques et financiers :

